

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΩΡΛ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατηγορία	Εκτίμηση περιστατικών	Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1	Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα	Μέχρι 2 εβδομάδες
2	Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα	3-6 εβδομάδες
3	Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη	7-12 εβδομάδες
4	Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη	13 -24 εβδομάδες
5	Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη	25 εβδομάδες και πάνω

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (Μέχρι 2 εβδομάδες)

- Ασθενείς με κακοήθειας περιοχής κεφαλής και τραχήλου επιβεβαιωμένες με ιστολογική εξέταση ή FNA. *(Κακοήθειες από πλακώδη κύτταρα περιοχής κεφαλής και τραχήλου, κακοήθεις όγκοι σιαλογόνων αδένων, κακοήθης όγκοι θυρεοειδούς (Bethesda V-VI) και παραθυρεοειδών αδένων)* **ICD-10** που ξεκινάει από **C**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (3-6 εβδομάδες)

- Ασθενείς με όγκους με έντονη κλινική υποψία για κακοήθεια χωρίς ιστολογική ή κυτταρολογική επιβεβαίωση. **ICD-10: D37.0, D38.0, D44.0, D48.5**
- Ασθενείς με μονόπλευρη κατάληψης ρινός και των παραρρινίων κόλπων (εκτός αυτών που έχουν χοανοπολύποδα) **ICD-10:D38.5**
- Ασθενείς με νεόπλασμα άγνωστης αβέβαιης συμπεριφοράς θυρεοειδούς αδένου (Bethesda III-IV) **ICD-10: D44.0**
- Ασθενείς με καταδυομένη βρογχοκήλη με πιεστικά φαινόμενα και παρεκτόπιση της τραχείας **ICD-10:E04**
- Ασθενείς με θυρεοτοξίκωση με διάχυτη βρογχοκήλη – μόνο οι Graves που δεν μπορεί να επιτευχθεί ευθυροειδισμός προεγχειρητικά. **ICD-10:E05.0**
- Ασθενείς με χολοστεατοματώδη ωτίτιδα **ICD-10: H71**
- Ασθενείς με ρινόρροια - Ωτόρροια ENY **ICD-10 :G96.0**

- Ασθενείς με χρόνια βλεννώδης μέση ωτίτιδα – glueear **ICD-10: H65.3**
- Ασθενείς για κοχλιακό εμφύτευμα. **ICD-10: H90.3**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (7-12 εβδομάδες)

- Ασθενείς με καλόηθηνεόπλασματameίζονων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων: **ICD-10: D11.0**
- Ασθενείς με σιελολιθίαση - Σιελαδενίτιδα **ICD-10: K11.2, K11.5**
- Ασθενείς με ιστορικό περιामυγδαλικών αποστημάτων **ICD-10: J36**
- Ασθενείς με χρόνια υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα (7 επεισόδια το χρόνο) **ICD-10: J35.0**
- Ασθενείς με άλλη χρόνια μη πυώδης μέση ωτίτιδα **ICD-10: H65**
- Ασθενείς με θυρεοτοξίκωση με διάχυτη βρογχοκήλη **ICD-10: E05.0**
- Ασθενείς με αδένωμα παραθυρεοειδούς. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός με συνυπάρχουσες νεφρικές ή οστικές συνυπάρχουσες επιπλοκές: **ICD-10: E21.0 + ICD-10 των συνυπαρχουσών επιπλοκών**(νεφρολιθίαση **ICD-10: N20**, οστεοπόρωση **ICD-10: M80, M81**, κλπ)
- Ασθενείς παιδιατρικοί με σοβαρού βαθμού (AHI>9) αποφρακτική υπνική άπνοια (Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων – τεκμηριωμένη με μελέτη ύπνου) **ICD-10: J35.3 + G47.31**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (13 -24 εβδομάδες)

- Ασθενείς με καλόηθες νεόπλασμα μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων **ICD-10: D14.0**
- Ασθενείς μεκαλοήθη νεοπλάσματα του στόματος και του φάρυγγα **ICD-10: D10**
- Ασθενείς με νεόπλασμα Συνδετικού και άλλων μαλακών μορίων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου (βραγχιακές κύστεις, κύστεις θυρεογλωσσικού, λιπώματα κλπ) **ICD-10: D21.0**
- Ασθενείς με άλλα καλοήθη νεοπλάσματα: Δέρματος τριχωτού κεφαλής και τραχήλου **ICD-10: D23.4**
- Ασθενείς με άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες (Bethesda I-II) **ICD-10: E04**
- Ασθενείς με χρόνια φλεγμονή των δακρυϊκών οδών **ICD-10: H04.4**
- Ασθενείς με αδένωμα παραθυρεοειδούς. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χωρίς συνυπάρχουσες νεφρικές ή οστικές συνυπάρχουσες επιπλοκές: **ICD-10: E21.0**
- Ασθενείς με χρόνια μέση ωτίτιδα μη χολοστεατωματώδης **ICD-10: H72**
- Ασθενείς με χρόνια μαστοειδίτιδα **ICD-10: H70.1**
- Ασθενείς με χρόνια αμυγδαλίτιδα (< 7 επεισόδια το χρόνο) **ICD-10: J35.0**
- Ασθενείς παιδιατρικοί με:
 - Υπερτροφία των αμυγδαλών **ICD-10: J35.1**
 - Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.2**
 - Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.3 χωρίς σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνική άπνοια** ή άλλα χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.8** ή χρόνια νόσημα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, μη καθορισμένο **ICD-10: J35.9**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (25 εβδομάδες και πάνω)

- Ασθενείς με πολύποδας φωνητικών χορδών **ICD-10: J38.1**

- Ασθενείς με υπερτροφία των ρινικών κογχών **ICD-10: J34.3**
- Ασθενείς με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος **ICD-10: J34.2**
- Ασθενείς με χρόνια παραρρινοκολπιτιδαχωρίς πολύποδες **ICD-10: J32**
- Ασθενείς με ρινικούςπολύποδες **ICD-10:J33**
- Ασθενείς Ενήλικες με:
 - Υπερτροφία των αμυγδαλών **ICD-10: J35.1**
 - Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.2**
 - Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.3** ή άλλα χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων **ICD-10: J35.8** ή χρόνιο νόσημα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, μη καθορισμένο **ICD-10: J35.9**
- Ασθενείς Ενήλικες μεαποφρακτική υπνική άπνοια **ICD-10: G47.31**
- Ασθενείς με επιφορά - Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών **ICD-10: H04.2 H04.5**
- Ασθενείς με ωτοσκλήρυνση **ICD-10: H80**
- Ασθενείς με με βραχύ χαλινό **ICD-10:Q38.1**

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- Ασθενείς με οξεία δύσπνοια
- Ασθενείς με αποστήματα κεφαλής τραχήλου.
- Ασθενείς με επιπλεγμένη ρινοκολπίτιδα (επέκταση φλεγμονής στου οφθαλμικούς κόγχους, κρανιακή κοιλότητα).
- Ασθενείς με ρινορραγία
- Ασθενείς με απόστημα δακρυϊκής συσκευής
- Ασθενείς με επιπλεγμένη χρόνια μέση ωτίτιδα
- Ασθενείς με ξένο σώμα
- Ασθενείς με αιμορραγία (μετά από χειρουργική επέμβαση όπως πχ αμυγδαλεκτομή)